Livret Patient

Chirurgie Ambulatoire

Dispositif Veineux Implantable (DVI)



Étiquette patient

Médecin référent :

.....

.....

unicancer

Réf. : 706 - juin 2024

ICM
Institut régional du Cancer
Montpellier | Val d'Aurelle

Madame, Monsieur,

Vous allez prochainement être admis(e) dans notre service de **Chirurgie Ambulatoire**. Notre équipe médicale, infirmière et administrative, vous y accueillera pour un séjour de quelques heures. Elle se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. Ce livret vous permettra de découvrir **les informations utiles pour bien préparer votre séjour**.



Documents administratifs à prévoir pour l'admission :

- Votre carte d'identité
- Votre carte vitale ou tout document justifiant de votre couverture sociale
- Votre carte mutuelle
- Votre attestation C.M.U

Pensez à prendre de quoi vous occuper pour la journée : lecture, téléphone car il peut y avoir de l'attente (selon votre heure de passage au bloc opératoire...)

Coordonnées

Secrétariat de Chirurgie Ambulatoire — 04 67 61 85 49
lundi : 9h - 19h
mardi, mercredi, jeudi : 8h - 19h
vendredi : 8h - 17h30

Accueil des Soins Externes (pansements) — 04 67 61 30 38
Du lundi au vendredi : 9h30 - 18h (fermé le week-end)

Service de Chirurgie (chirurgien de garde) — 04 70 01 38 16
Nuit et Week-end uniquement — 06 01 32 90 89

Votre médecin généraliste : Dr ..... — .....


Votre infirmier(e) à Domicile — .....

Standard de l'ICM — 04 67 61 31 00

1. Mise en place d'un dispositif veineux implantable (DVI)

De quoi s'agit-il ?

C'est un **boîtier en acier léger** (15 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur) avec une membrane en silicone qui est relié par un cathéter à une grosse veine. À l'aide d'une aiguille spéciale (dite aiguille de Huber), il **permet de vous perfuser ou de réaliser des traitements intraveineux** sans utiliser les veines périphériques et de préserver votre confort.



L'opération

La pose d'un site veineux implantable est un acte chirurgical réalisé au bloc opératoire, sous anesthésie locale le plus souvent, couplée à une éventuelle sédation intraveineuse en fonction des patients.
La chambre est placée sous la peau le plus discrètement possible en dessous de la clavicule, elle est reliée à un cathéter introduit dans une veine, dont l'extrémité est positionnée sous contrôle radiologique dans la veine cave supérieure. L'intervention est de courte durée.

Si une anesthésie générale est prévue, une consultation préalable avec un médecin anesthésiste est indispensable avant la pose.

Le retrait du site veineux implantable est un acte simple et rapide, réalisé sur décision médicale, dans un bloc opératoire sous anesthésie locale, par la même incision que celle de la pose.

En pratique

Si vous pratiquez des activités physiques (port de sac à dos, chasse, tir à l'arc...), qui sollicitent cette zone, parlez-en avec le chirurgien pour le choix de l'implantation.

2. Avant l'intervention

Les consignes

- Dans la mesure du possible, contactez une infirmière libérale pour qu'elle vienne faire votre pansement le lendemain de l'intervention, sauf indication contraire du chirurgien.
- Respectez les consignes qui vous ont été données en consultation concernant votre traitement personnel.
- Apportez les résultats des examens médicaux demandés : bilans sanguins (NFS, Plaquettes, TP, INR, TCA).



3. La veille de l'intervention

- **Si vous n'avez pas l'application mon ICM**, une assistante médicale vous téléphonera la veille de l'intervention pour faire une dernière mise au point sur l'organisation de votre séjour et vous donner votre horaire d'arrivée.
- **Si vous avez l'application mon ICM**, toutes les informations sur l'organisation de votre séjour y seront renseignées

Les consignes

- **Ne venez pas à jeun, sauf avis contraire du médecin ou en cas d'anesthésie générale.**

Règles d'hygiène de base avant l'intervention



Brossez-vous les dents



Une dépilation de la zone opératoire si cela vous est prescrit par votre praticien avec une crème dépilatoire hypoallergénique.

⚠ rasoir INTERDIT !



Nettoyer et couper vos ongles de mains et de pieds



Retirer tout maquillage, vernis à ongles, bijoux et piercing



Mettez des vêtements et sous-vêtements « propres du jour »

La douche préopératoire

La bonne réalisation de la douche préopératoire permet d'éliminer les micro-organismes colonisant la zone opératoire. Une préparation rigoureuse préopératoire **diminue les risques d'infections chirurgicales.**

Comment vous doucher?

- Mouillez-vous puis savonnez en insistant durant 3 minutes : *cheveux, oreilles, aisselles, sillons sous mammaires, nombril, plis de l'aine, régions génitale et anales, pieds et ongles.*
- Rincez-vous abondamment
- Séchez-vous avec une serviette propre

Avant l'intervention, vous devez prendre 2 douches préopératoires



La veille de l'intervention



Moins de 2h avant l'intervention

4. Le jour de l'intervention

- **Passez par l'entrée principale du bâtiment A**, avenue des Apothicaires, pour accéder au service de Chirurgie Ambulatoire.
- **Respectez les horaires de convocation :** partez suffisamment à l'heure de votre domicile afin d'éviter tout stress inutile.

À votre arrivée dans le service :

- Les infirmières du service vous installent dans un box équipé d'un vestiaire pour ranger vos affaires personnelles.
- Elles mettent à jour votre dossier de soins puis vous préparent pour l'intervention. Une tenue spécifique pour le bloc opératoire vous sera remise.

L'intervention :

Vous serez conduit(e) au bloc opératoire à pied puis accueilli(e) par le personnel de secteur qui vous prendra en charge.

5. Après l'intervention

Après la pose :

La douleur est le plus souvent modérée et soulagée par des antalgiques de type paracétamol.

Suivez les consignes concernant le traitement de la douleur qui vous a été prescrit en systématique les 48 premières heures, ainsi que pour la reprise de vos traitements habituels.

Le lendemain de l'opération, contactez l'infirmier de ville que vous aurez désigné à la consultation, afin qu'il passe pour refaire votre pansement. Ce dernier sera refait tous les 2 jours et n'est plus nécessaire après la cicatrisation. Si les fils ne sont pas résorbables, ils seront enlevés entre le 12e et le 14e jour.



Toutes les ordonnances vous seront remises à votre sortie.

- Une carte d'identification du matériel sera remise lors de la pose, qu'il faudra garder sur vous.
- Vous serez appelé(e) le lendemain matin sauf si vous avez l'application MonICM.

Après cicatrisation :

- Les douches sont possibles sans précautions particulières. Ne craignez pas de vous savonner.
- Vous pouvez vous baigner, nager, continuer à vous habiller normalement.
- Évitez de porter du poids et de dormir du côté du DVI.
- Le matériel est compatible avec le scanner et l'IRM. Il ne déclenche pas les radars de détection (le signaler au contrôle).
- Le DVI ne nécessite pas d'entretien particulier, notamment pas de rinçage entre les périodes d'utilisation.
- Avant d'implanter l'aiguille de Huber, la pose d'un patch anesthésique sur la peau au contact du boîtier une heure avant permet d'augmenter le confort et de diminuer sensiblement la sensation de piqûre.

Complications postopératoires :

Habituellement sans problème, la pose d'un site veineux implantable peut entraîner quelques complications.

Au cours des premières heures qui suivent la pose peuvent apparaître :

- **Des signes locaux :** œdème, rougeur, hématome
- **Des signes généraux :** douleur thoracique, gêne respiratoire, fièvre et frissons.

⚠ Ces symptômes doivent vous amener à consulter en urgence.

À distance :

- **Le DVI peut se boucher** (reflux sanguin ou dépôt médicamenteux). En agissant rapidement il peut être rincé et débouché.
- **La veine peut se thromboser**. Les signes cliniques à surveiller sont : douleurs, œdème, rougeur au niveau du cou, du thorax ou du bras du côté où le DVI a été posé. **⚠ Ces symptômes doivent vous amener à consulter.**
- **Le DVI peut s'infecter** : il faut surveiller l'apparition d'une rougeur, d'une désunion ou d'un écoulement au niveau de la cicatrice. Il peut y avoir des manifestations générales comme des frissons ou de la fièvre. Cette infection peut être prévenue par des soins d'hygiène et une asepsie (désinfection) rigoureuse lors de la manipulation.



Institut du Cancer de Montpellier

Parc Euromédecine - 208, Avenue des Apothicaires
34298 Montpellier Cedex 5

Directeur Général : Pr Marc YCHOU
Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif

ICM
Institut régional du Cancer Montpellier

unicancer

www.icm.unicancer.fr